

APSINUODIJIMO SUNKUMO SKALĖ

SISTEMA AR ORGANAS	LENGVAS	VIDUTINIS	SUNKUS	LABAI SUNKUS
	1	2	3	4
	<i>Nežymūs požymiai ar reiškiniai</i>	<i>Akivaizdūs ar užsitęsę požymiai ar reiškiniai</i>	<i>Žymūs požymiai ir reiškiniai</i>	<i>Labai žymūs ar pavojingi gyvybei požymiai ar reiškiniai</i>
Virškinamasis traktas	<ul style="list-style-type: none"> Vėmimas, diarėja, skausmas Burnos sudirginimas, I laipsnio nudegimas, minimalus burnos išopėjimas Endoskopija: eritema, edema 	<ul style="list-style-type: none"> Besikartojantis ar užsitęsęs vėmimas, diarėja, skausmas Disfagija Išplitęs I laipsnio nudegimas Endoskopija: eritema, edema 	<ul style="list-style-type: none"> Žarnyno nepraeinamumas, kraujavimas Ribotos apimties II ir III laipsnio nudegimas Endoskopija: opinis transmukozinis pažeidimas 	<ul style="list-style-type: none"> Gausus kraujavimas, perforacija Išplitę II ir III laipsnio nudegimai Sunki disfagija Endoskopija: opinis transmuralinis pažeidimas, žiedinis pažeidimas, perforacija
Kvėpavimo sistema	<ul style="list-style-type: none"> Suerzinimas, dirginantis kosulys, dusulys, lengva dispnėja, lengvas bronchospazmas Krūtinės rentgenoskopija: nedideli pokyčiai su minimaliais požymiais ar be simptomų 	<ul style="list-style-type: none"> Užsitęsęs kosulys, bronchospazmas, dispnėja; stridoras; Krūtinės rentgenoskopija: neatitinkanti normos su vidutiniais pokyčiais 	<ul style="list-style-type: none"> Deguonies inhaliacijomis koreguotina hipoksemija Krūtinės rentgenoskopija: neatitinkanti normos su ryškiais pokyčiais 	<ul style="list-style-type: none"> Plaučių edema; pneumonija; bradipnėja Ūminis kvėpavimo nepakankamumas su DPV; ARDS Krūtinės rentgenoskopija: neatitinkanti normos su itin ryškiais pokyčiais
CNS	<ul style="list-style-type: none"> Mieguistumas, svaigimas, ūžimas ausyse, ataksija Neramumas Nežymūs ekstrapiramidiniai simptomai Nežymūs cholinerginiai ar anticholinerginiai simptomai Parestezijos Nežymūs regos ar klausos sutrikimai 	<ul style="list-style-type: none"> Trumpa apnėja, bradipnėja Sutrikimas, ažitacija Izoliuotas generalizuotų ar lokalių traukulių epizodas Akivaizdūs ekstrapiramidiniai simptomai Išreikšti cholinerginiai ar anticholinerginiai simptomai Lokalus paralyžius neįtakojantis gyvybinių funkcijų Regos ir klausos sutrikimai 	<ul style="list-style-type: none"> Koma su reakcija į skausmą Haliucinacijos, deliras, sunki ažitacija Generalizuoti traukuliai Sunkūs ekstrapiramidiniai simptomai Generalizuotas paralyžius Kvėpavimo slopinimas Aklumas, kurtumas 	<ul style="list-style-type: none"> Gili koma su reakcija ar be reakcijos į skausmą Kvėpavimo nepakankamumas Dažni generalizuoti traukuliai, traukulinė būklė, opistotonusas Paralyžius, įtakojantis gyvybines funkcijas
Širdies kraujagyslių sistema	<ul style="list-style-type: none"> Izoliuota ekstrasistolija Lengva ir trumpalaikė hipotenzija 	<ul style="list-style-type: none"> Sinusinė bradikardija (ŠSD 40-50 suaugusiesiems) Sinusinė tachikardija (ŠSD 140-180 suaugusiesiems) Repolarizacijos sutrikimai, I laipsnio AV blokas Miokardo išemija Akivaizdi hipotenzija 	<ul style="list-style-type: none"> Dažna ekstrasistolija, prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas, II laipsnio AV blokas, prasiplėtęs QRS, pailgėjęs QT laikas, repolarizacijos sutrikimai Miokardo infarktas Hipertenzinė krizė Simptomimimetiniais vaistais koreguotina hipotonija 	<ul style="list-style-type: none"> Sunki sinusinė bradikardija (ŠSD < 40 suaugusiesiems) Sunki sinusinė tachikardija (ŠSD > 180 suaugusiesiems) Gyvybei pavojingi skilveliniai ritmo sutrikimai, III laipsnio AV blokada, asistolija Miokardo infarktas su kraujotakos nepakankamumu Šokas

Metabolinis balansas	<ul style="list-style-type: none"> Lengvi rūgščių – šarmų sutrikimai (HCO_3^- 15-20 ar 30-40 mmol/l, pH 7,25-7,32 ar 7,50-7,59) Lengvi elektrolitų ir skysčių balanso sutrikimai (K^+ 3,0-3,4 ar 5,2-5,9 mmol/l) Lengva hipoglikemija (2,8-3,9 mmol/l suaugusiesiems) Trumpai besitęsianti hipertermija 	<ul style="list-style-type: none"> Vidutinio sunkumo rūgščių – šarmų sutrikimai (HCO_3^- 10-14 ar > 40 mmol/l, pH 7,15-7,24 ar 7,60-7,69) Vidutinio sunkumo elektrolitų ir skysčių balanso sutrikimai (K^+ 2,5-2,9 ar 6,0-6,9 mmol/l) Lengva hipoglikemija (1,7-2,8 mmol/l suaugusiesiems) Užsitęsusi hipertermija 	<ul style="list-style-type: none"> Sunkūs rūgščių – šarmų sutrikimai (HCO_3^- 6 -10 ar 30-40 mmol/l, pH 7,00-7,15 ar 7,7-7,79). Sunkūs elektrolitų ir skysčių balanso sutrikimai (K^+ 2,0-2,5 ar 7,0-7,49 mmol/l) Sunki hipoglikemija (1,0-1,7 mmol/l suaugusiesiems) Pavojinga hipo - ar hipertermija 	<ul style="list-style-type: none"> Itin sunkūs rūgščių – šarmų sutrikimai (pH <7,00 ar >7,8). Itin sunkūs elektrolitų ir skysčių balanso sutrikimai (K^+ <2,0 ar >7,5 mmol/l) Sunki hipoglikemija (<1,0 mmol/l suaugusiesiems)
Kepenys	<ul style="list-style-type: none"> Nežymiai padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas (AST, ALT 2-5 x norma) 	<ul style="list-style-type: none"> Padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas (AST, ALT 5-30 x norma), <i>kai</i> nerandama kepenų pažeidimo biocheminių požymių (amoniakas, krešėjimo faktorių stoka) <i>arba</i> kai kepenų disfunkcija kliniškai neišreikšta 	<ul style="list-style-type: none"> Padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas (AST, ALT 30-50 x norma), <i>kai</i> nustatomi kepenų pažeidimo biocheminiai požymiai (amoniakas, krešėjimo faktorių stoka) <i>arba</i> kai kliniškai išreikšta kepenų disfunkcija 	<ul style="list-style-type: none"> Padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas (AST, ALT >50 x norma) <i>arba</i> klinikiniai kepenų nepakankamumo požymiai
Inkstai	<ul style="list-style-type: none"> Nežymi proteinurija ar mikrohematurija 	<ul style="list-style-type: none"> Ryški proteinurija ar makrohematurija Inkstų disfunkcija (oligurija, poliurija iki 8000 ml) 	<ul style="list-style-type: none"> Inkstų disfunkcija (oligurija, poliurija > 8000 ml, kreatinino serume 200-500 $\mu\text{mol/l}$) 	<ul style="list-style-type: none"> Inkstų funkcijos nepakankamumas (anurija, kreatinino serume >500 $\mu\text{mol/l}$)
Kraujas	<ul style="list-style-type: none"> Hemolizės požymiai Nežymi methemoglobinemija (metHb iki 20 %) 	<ul style="list-style-type: none"> Nežymi hemolizė Koaguliacijos sutrikimai be kraujavimo Anemija, leukopenija, trombocitopenija Methemoglobinemija (21-35 %) 	<ul style="list-style-type: none"> Hemolizė Išreikšta methemoglobinemija (metHb 35-50 %) Sunki anemija, leukopenija, trombocitopenija 	<ul style="list-style-type: none"> Sunki hemolizė Sunki methemoglobinemija (metHb > 50 %) Koaguliacijos sutrikimai su kraujavimu Gyvybei pavojinga anemija, leukopenija, trombocitopenija
Raumenys	<ul style="list-style-type: none"> Nežymus skausmingumas, įtempimas Kreatininfosfokinazė 250-1500 IU/l 	<ul style="list-style-type: none"> Skausmas, rigidiškumas, trūkčiojimai ir fascikuliacijos Rabdomiolizė (kreatininfosfokinazė 1500-10000 IU/l) 	<ul style="list-style-type: none"> Pozicinio suspaudimo sindromas Sunki rabdomiolizė be komplikacijų (kreatininfosfokinazė > 10000 IU/l) 	<ul style="list-style-type: none"> Intensyvus skausmas, ribinis rigidiškumas, intensyvūs trūkčiojimai ir fascikuliacijos Rabdomiolizė su komplikacijomis (kreatininfosfokinazė > 10000 IU/l)