

APSINUODIJIMO DIAGNOZĖS FORMULAVIMO YPATUMAI

Apsinuodijusio paciento diagnozė turi atskleisti informaciją, nusakančią nuodingą medžiagą, apsinuodijimo eigą, pobūdį ir sunkumą, nuodų patekimo būdą ir kt., todėl jos formulavimas yra tiksliai reglamentuotas.

Apsinuodijimo sunkumo laipsnis dažniausiai nustatomas retrogradiškai, remiantis ASS (žr. 8–10 psl.), kuri taikoma įvertinti ūminius apsinuodijimus pagal sunkiausius stebėtus simptomus. Schema turi būti taikoma labai lanksčiai, nereikėtų atsižvelgti į išgertą nuodų kiekį ar jų koncentraciją serume, nevertinamas taikytas gydymas (pvz., detoksikacinė hemodializė ar priešnuodžių vartojimas).

Lotyniška diagnozė	
Seka	Pavyzdžiai
<ul style="list-style-type: none"> • Apsinuodijimas (<i>intoxicatio</i>) • eiga (<i>acuta, chronica</i>) • pobūdis (<i>accidentalis, suicidalis, intentionalis, narcomanicus, professionalis, criminalis, homicidalis, inverificatus</i>) • nuodų patekimo būdas (<i>peroralis, inhalationalis, percutaneus, intramuscularis, intravascularis, inverificatus</i>) • <i>cum</i> • nuodingoji medžiaga • apsinuodijimo sunkumo laipsnis (I° arba <i>levis</i>, II° arba <i>moderata</i>, III° arba <i>gravis</i>) • komplikacijos 	<p>Dgn.: <i>Intoxicatio acuta accidentalis peroralis cum Acido acetico gravis. Combustio tr. digestorii, haemolysis, insuffitientia renalis acuta</i></p> <p>Dgn.: <i>Intoxicatio acuta suicidalis peroralis cum Phenobarbitalo gravis. Coma</i></p> <p>Dgn.: <i>Intoxicatio acuta accidentalis inhalationalis cum Hydrargii gravis. Oedema pulmonum</i></p> <p>Dgn.: <i>Intoxicatio acuta inverificatus inverificatus cum substantia inverificata moderata. Coma</i></p>
Lietuviška diagnozė	
Seka	Pavyzdžiai
<ul style="list-style-type: none"> • Eiga (ūminis, lėtinis) • pobūdis (atsitiktinis, savižudiškas, tyčinis, narkomaniškas, profesinis, kriminalinis, žmogžudiškas, nepatikslingas) • nuodų patekimo būdas (peroralinis, arba pro burną, inhaliacinis, perkutaninis, arba pro odą, intramuskulinis, intravaskulinis, nepatikslingas) • sunkumo laipsnis (I° arba lengvas, II° arba vidutinis, III° arba sunkus) • apsinuodijimas • nuodingoji medžiaga • komplikacijos 	<p>Dgn.: Ūminis savižudiškas peroralinis vidutinio sunkumo apsinuodijimas amitriptilinu</p> <p>Dgn.: Ūminis atsitiktinis peroralinis sunkus apsinuodijimas etilenglikoliu. Ūminis inkstų nepakankamumas</p> <p>Dgn.: Ūminis nepatikslingas nepatikslingas vidutinio sunkumo apsinuodijimas nežinoma medžiaga. Koma</p>
Diagnozės formulavimas, apsinuodijus gyvačių ar vabzdžių nuodais	
Lotyniškai	Lietuviškai
<p>Dgn.: <i>Intoxicatio moderata propter morsum serpentis in regionem pedis dextri</i></p> <p>Dgn.: <i>Intoxicatio gravis propter morsum apium multiplex</i></p>	<p>Dgn.: Gyvatės įkandimas į dešinę pėdą, vidutinio sunkumo intoksikacija</p> <p>Dgn.: Dauginis bičių įgėlimas, sunki intoksikacija</p>
Trumpas apsinuodijimo sunkumo skalės (ASS) apibendrinimas	
<ul style="list-style-type: none"> • Lengvi apsinuodijimai • Vidutinio sunkumo apsinuodijimai • Sunkūs apsinuodijimai 	<ul style="list-style-type: none"> • Nežymūs sveikatos sutrikimai • Ryškūs, tačiau grįžtami ir grėsmės paciento gyvybei nekeliantys sveikatos sutrikimai • Sutrikusios gyvybinės funkcijos ir (arba) negrįžtami bei grėsmę paciento gyvybei keliantys sveikatos sutrikimai