

ENTEROSORBCIJA: VIENKARTINĖ AKTYVINTOSIOS ANGLIES DOZĖ

Gydymo metodas	Enterosorbicija, vienkartinė aktyvintosios anglies dozė
Metodika	Enterosorbicija dažniausiai yra atliekama, skiriant 0,5–1 g/kg (vaikams iki 1 metų – 10–25 g, 1–12 metų – 25–50 g, paaugliams ir suaugusiesiems – 25–100 g) aktyvintosios anglies prieš, po arba vietoj skrandžio plovimo pro zondą ar vėmimo sukėlimo. Su vandeniu sumaišytos aktyvintosios anglies reikia duoti išgerti arba supilti pro zondą. Patogiau yra vartoti paruoštas skystas šio enterosorbento formas, turinčias didesnį veiklų paviršių, daugiau kaip 100 g skirti nerekomenduojama, nes galimas vėmimo ir aspiracijos pavojus Apsinuodijus enterosorbentų gali būti skiriama vieną kartą arba vieną – dvi paras kas 2–8 val. (žr. apie kartotinių enterosorbentų vartojimą) Enterosorbicijai yra vartojamos ir jonų apykaitinės dervos, skiriamos pagal nurodymus informaciniuose lapeliuose
Indikacijos	Skiriama: <ul style="list-style-type: none"> • aktyvintosios anglies pirmosiomis 60 min. (galima ir vėliau), apsinuodijus potencialiai toksiniu arba gyvybei pavojingu nuodų kiekiu, • cholestiramino, kolestipolio, apsinuodijus chlorintais angliavandeniliais ar širdį veikiančiais glikozidais, • kalcio polistireno sulfonato hiperkalemijai gydyti, • natrio polistireno sulfonato, apsinuodijus ličio druskomis
Kontraindikacijos	<ul style="list-style-type: none"> • Neapsaugoti kvėpavimo takai, kai nėra apsauginių jų refleksų arba yra aspiracijos pavojus • Virškinamojo kanalo nepraeinamumas arba perforacijos • Apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis • Numatomas paciento gydymas geriamaisiais priešnuodžiais • Numatomi endoskopiniai tyrimai
Komplikacijos	<ul style="list-style-type: none"> • Pykinimas, vėmimas, aspiracija, pilvo skausmai, viduriavimas, tai komplikacijos, kurios dažniau pasitaiko, jeigu kartu skiriama sorbitolio • Vidurių užkietėjimas pasitaiko, skiriant kartotines enterosorbentų dozes
Pastabos	<p>Aktyvintoji anglis nejungia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arseno ir metalų (cinko, gyvsidabrio, kadmio, švino, kalcio, kalio, ličio, magnio, natrio ir kt.), • rūgščių ir šarmų, • angliavandenių, • alkoholių, • glikolių, • aliejų <p>Jeigu vartojamos aktyvintosios anglies tabletės, skirti apsinuodijusiam pacientui tinkamą dozę yra sunku</p>