

## ENTEROSORBCIJA: KARTOTINĖS AKTYVINTOSIOS ANGLIES DOZĖS

<b>Gydymo metodas</b>	Enterosorbicija, kartotinės aktyvintosios anglies dozės
<b>Metodika</b>	Vartojant skystus enterosorbentus arba iš enterosorbentų miltelių pagamintą suspensiją, skiriama iki 1 g/kg pradinė dozė, o vėliau kas 2–4 val. ar rečiau – kartotinės iki 0,5 g/kg dozės, jeigu nėra papildomų indikacijų, taikoma ne ilgiau kaip 24 val. Su pirmąja enterosorbentų doze rekomenduojama skirti vidurių laisvinamųjų vaistų, pvz., sorbitolio
<b>Indikacijos</b>	Tikslių daugkartinio enterosorbentų vartojimo indikacijų nėra, turėtų spartinti nuodingųjų medžiagų, kurioms būdinga enterohepatinė ir enteroenterinė kartotinė cirkuliacija (recirkuliacija), šalinimą iš organizmo Aktyvintąją anglį: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rekomenduojama vartoti, apsinuodijus chininu, dapsonu, fenobarbitaliu, karbamazepinu, teofilinu, taip pat digitoksinu ir digoksinu,</li> <li>• poveikio galima tikėtis, gydant apsinuodijimus benzodiazepiniais, fenotiaziniais, glutetimidu, meprobamatu, nadololiu, salicilatais, tricikliais antidepresantais, valproino rūgšties dariniais, vaistų kapsulėmis arba, kai nuodingosios medžiagos linkusios sulipti (sudaryti bezoarus) Cholestiraminas ir kolestipolis (po 8 g kas 6 val.) tinka apsinuodijus chlorintais angliavandeniliais ir širdį veikiančiais glikozidais, kaliui šalinti skiriama kalcio polistireno sulfonato</li> </ul>
<b>Kontraindikacijos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neapsaugoti kvėpavimo takai, kai nėra apsauginių jų refleksų arba kyla aspiracijos pavojus</li> <li>• Virškinamojo kanalo nepraeinamumas arba perforacijos</li> <li>• Apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis</li> <li>• Numatomas paciento gydymas geriamaisiais priešnuodžiais arba vaistais</li> <li>• Numatomi endoskopiniai tyrimai</li> </ul>
<b>Komplikacijos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pykinimas, vėmimas, aspiracija, pilvo skausmai, viduriavimas, tai komplikacijos, kurios dažniau pasitaiko, jeigu kartu skiriama sorbitolio</li> <li>• Vidurių užkietėjimas</li> </ul>
<b>Pastabos</b>	Jeigu vartojamos aktyvintosios anglies tabletės, skirti apsinuodijusiam pacientui tinkamą dozę yra sunku