

Dimerkaprolas

Nuodingoji medžiaga	Arseno ir aukso junginiai
Indikacijos	Apsinuodijus
Priešnuodžio vartojimas	Švirkšti giliai į raumenis po 2,5 mg/kg kas 6 val. 2 paras, po to kas 12 val. 1 parą ir kas 24 val. 10 kartų Apsinuodijus sunkiai – švirkšti giliai į raumenis po 3 mg/kg kas 4 val. 2 paras, po to kas 6 val. 1 parą ir kas 12 val. 10 parų
Nuodingoji medžiaga	Gyvsidabrio junginiai
Indikacijos	Apsinuodijus
Priešnuodžio vartojimas	Švirkšti giliai į raumenis iš pradžių po 5 mg/kg, vėliau po 2,5 mg/kg 1–2 kartus per dieną 10 parų
Nuodingoji medžiaga	Švino junginiai
Indikacijos	Apsinuodijus
Priešnuodžio vartojimas	Švirkšti giliai į raumenis vieną kartą 4 mg/kg, po to po 3 mg/kg kas 4 val. 2–5 paras Apsinuodijus sunkiai, kai yra ūminė švino sukelta encefalopatija ir (arba) švino koncentracija kraujyje daugiau kaip 700 mkg/l – švirkšti giliai į raumenis po 4 mg/kg kas 4 val. 3–5 paras, jeigu reikalingas ilgesnės trukmės gydymas, būtina ne trumpesnė kaip 2 parų pertrauka Nuo antrosios dimerkaprolo dozės rekomenduojama kartu skirti kalcio ir natrio EDTA