

PAPRASTOSIOS ANGIES ĮKANDIMAS

Paprastoji angis (*Vipera berus*)

Dar vadinama gyvate marguole, margąja arba pantine gyvate, yra vienintelis nuodingas Lietuvos roplis

Mirtina dozė

Vienos gyvatės įkandimas paprastai nėra mirtinas

Apsinuodijimo įtarimo kriterijai

- pacientas matė gyvatę, pajuto skausmą įkandimo metu
- pacientas gyvatės nematė, bet yra dantų žymės, paprastai dvi, bet gali būti ir daugiau arba ir nelyginis skaičius

Paciento stebėjimas

- įtarus įkandimą arba po asimptominio („sausu“) įkandimo pacientą reikia stebėti 8–12 val.
- jeigu yra vietinių pakitimų – imobilizavus įkąstą galūnę pacientai turi būti stebimi ne mažiau kaip 24 val.

Jeigu išreikšti vietiniai pakitimai arba bet kokie bendriniai simptomai – pacientą būtina stacionarizuoti, kai yra anafilaksinis šokas – į intensyviosios terapijos padalinį

Apsinuodijimo simptomai

Įkandimas skausmingas, dažniausiai įgeltos galūnės tinsta, vėliau gali būti limfangoitas, limfadenitas. Ankstyvieji bendriniai simptomai: baimė, galvos skausmas ir svaigimas, silpnumas, tachikardija, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, vėliau – saikinga anemija (dėl hemolizės), gali būti krešumo sutrikimų, retai bronchospazmas, toksinis šokas, ūminis širdies, inkstų ir kepenų nepakankamumas, traukuliai, rbdomiolizė

Pavojingiausios įkandimo vietos galva, ypač veidas

Gali būti vadinamųjų „sausų“ įkandimų, kurių metu nesusvirkščinama nuodų

Tyrimai

Klinikinis kraujo tyrimas, SPA (jeigu yra pakitimų – kartoti ne rečiau kaip kas 24 val.)

Kalis, natris

EKG

Įkąstos galūnės tinimo dinamiką stebėti, matuojant jos apimtį:

- reikia pamatuoti abi galūnes tose pačiose vietose
- tinstančią galūnę reguliariai matuoti tose pačiose vietose ir užsirašyti apimtis
- pasižymėti vietinių pakitimų viršutinę ribą

Gydymas

Antitoksinis serumas nuo gyvačių nuodų skiriamas pagal nurodymus informaciniame lapelyje (10–15 proc. pacientų gali sukelti seruminę ligą). Rekomenduojamos indikacijos:

išreikšti bendriniai simptomai

išreikšti arba progresuoja vietiniai pakitimai

Antitetaninis serumas. Reikia sušvirkšti suaugusiesiems, kurie gali nebeturėti imuniteto stabligei

Keletas patarimų **simptominiam gydymui**

Antibiotikų profilaktiškai neskirti

Antikoagulantų (heparino arba smulkiamolekulinių heparinų) skirti tik atsiradus flebito požymiams

Daugiau informacijos žr. MOKOMOJI MEDŽIAGA → Medicinos studentams → Paprastoji angis