

Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio
2024-06-06

Vadovaujantis 2004 m. birželio 28 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-468 „Dėl Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ 11.10 punktu universiteto ligoninėse ir respublikos lygmens stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti stacionarines klinikinės toksikologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi būti injeckinio etanolio tirpalo arba 6 g fomepizolo.

Dėl aukštesnės fomepizolo kainos ir organizacinių sunkumų jį įsigyjant, visos ASPJ apsiriboja žymiai pigesniu, bet ne mažiau veiksmingu injeckiniu etanolio tirpalu. Problema yra tai, kad etanolį tenka naudoti įvairaus amžiaus vaikų ir nėščiąjų moterų gydymui, 24 val. laikotarpiu palaikant jų kraujyje ne mažesnę kaip vienos promilės gydomąją koncentraciją. Tokių pacientų nėra daug, tačiau jauniausių, kuriuos dėl apsinuodijimo etilenglikoliu reikėjo gydyti etanolio, amžius buvo nuo 4 mėnesių iki 2 metų.

Prašome Jūsų pataisyti 2004 m. birželio 28 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-468 nuostatas, įtraukiant fomepizolą į universiteto ligoninių ir respublikos lygmens stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra gydomi apsinuodijusieji vaikai, Būtinųjų priešnuodžių rinkinį, kaip privalomą, o ne pasirenkamą priešnuodį.



dr. Dovilė Grinkevičiūtė

Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugijos valdybos pirmininkė

Jonas Šurkus

Lietuvos aferezinių ir klinikinės toksikologijos asociacijos pirmininkas

Tel. +370 699 28287

El. p. jonas.surkus@kaunoklinikos.lt

